

## **IMPFUNGEN FÜR PFERDE**

Pferden können gegen folgende Krankheiten durch eine Impfung geschützt werden:

- **Tetanus**
- **Influenza**
- **Herpes**
- **Tollwut**
- **Hautpilzerkrankungen**

### **TETANUS**

Wie Menschen können auch Pferde an Wundstarrkrampf (Tetanus) erkranken. Pferde infizieren sich jedoch wesentlich leichter als der Mensch. Eine kleine Wunde kann als Eintrittspforte für die überall vorkommenden Erreger ausreichen. Erkrankt ein Pferd an Tetanus, sind die Überlebenschancen äußerst gering. Aus diesem Grund sollte jedes Pferd gegen Tetanus geimpft werden.

#### Impfschema:

- Grundimmunisierung: 2 Impfungen im Abstand von 4 bis 8 Wochen
- 3. Impfung nach 1 Jahr
- Wiederholungsimpfungen alle 2 Jahre

### **INFLUENZA**

Bei Turnierpferden ist die Influenza-Impfung *von der FN(Deutsche Reiterliche Vereinigung) vorgeschrieben*, zwischen dem Turnierstart und dem Abschluss der Grundimmunisierung müssen mindestens 14 Tage liegen.

#### Impfschema:

- Grundimmunisierung: 2 Impfungen im Abstand von 4 bis 8 Wochen
- 3. Impfung nach 6 Monaten
- Wiederholungsimpfungen alle 6 Monate

### **HERPES**

Herpes kann Erkrankungen des Atmungsapparates, des Bewegungsapparates und des Fortpflanzungsapparates (Fehlgeburten) auslösen.

#### Impfschema:

- Grundimmunisierung: 2 Impfungen im Abstand von 4 bis 8 Wochen
- Wiederholungsimpfungen alle 6 Monate

## **TOLLWUT**

Gegen Tollwut sollten Pferde geimpft werden, die regelmäßigen Weidegang haben und deren Koppeln am Waldrand oder in einem tollwutgefährdeten Bezirk liegen.

### Impfschema:

- 1. Impfung ab 4. Lebensmonat, falls die Mutterstute nicht geimpft ist
- 1. Impfung ab 9. Lebensmonat, falls die Mutterstute geimpft ist
- Wiederholungsimpfungen alle 12 Monate

## **HAUTPILZ**

Beim Pferd treten Hautpilzkrankungen besonders bei immungeschwächten Tieren auf, z.B. nach Infektionen und Stresssituationen.

Die Impfung kann sowohl therapeutisch (das Pferd ist bereits erkrankt) als auch prophylaktisch (zum Schutz vor einer Infektion) eingesetzt werden.

### Impfschema:

- Grundimmunisierung: 2 Impfungen im Abstand von 2 Wochen
- Wiederholungsimpfungen alle 6 Monate

## ENTWURMUNGSSCHEMA FÜR PFERDE

MONAT	PARASIT	WIRKSTOFF
Januar	Magendasseln Rundwürmer	Ivermectin
April/Mai	Rundwürmer	Ivermectin/Moxidectin <i>oder</i> Pyrantel
Juni/Juli	Rund- und Bandwürmer	Ivermectin <i>oder</i> Pyrantel <b>plus</b> Praziquantel
August/September	Rundwürmer	Ivermectin/Moxidectin <i>oder</i> Pyrantel
Oktober/November	Rund- und Bandwürmer Magendasseln	Ivermectin <b>plus</b> Praziquantel